


Endoscopia Alta



¿Qué es una endoscopia alta?

El doctor de su niño ha recomendado una endoscopia alta (también llamada esofagogastroduodenoscopia o EGD). Esta es una prueba en la que el doctor mira directamente dentro del esófago, estómago y parte alta del intestino delgado

con un tubo flexible y delgado montado con una cámara y una lámpara, para ayudarle a averiguar por qué los niños tienen dolor de estómago, diarrea, vómito o problemas de crecimiento. El doctor puede tomar muy pequeñas muestras de tejido, del tamaño de una cabeza de alfiler.

Razones por las que los niños pueden necesitar una endoscopia alta

Hay muchas razones por las que los niños pueden necesitar una endoscopia alta incluyendo:

- Vómito
- Problemas para tragar
- Problemas para crecer
- Diarrea
- Dolor de estómago
- Sacar alimentos, monedas y otras cosas que se quedan atoradas

¿Qué pasa antes y después de la prueba?

Antes de la prueba, en la mañana de la prueba, su niño no debe comer o beber nada porque esto puede causar problemas con la medicina para dormir administrada antes de la prueba.

Después de la prueba, su doctor puede tener fotos para mostrarle. Al mismo tiempo, puede decirle a su familia si hay alguna medicina que su niño deba tomar. Una vez que esté bebiendo líquidos sin problemas, su niño puede empezar a comer de nuevo y puede irse a casa. Algunos niños se sienten mal después de la prueba y pueden ser controlados por un poco más de tiempo.

Después de la prueba, si su niño tiene cualquiera de estos síntomas, llame a su doctor:

- Dolor de estómago por más de una hora. La mayoría de niños se siente bien después de la prueba.
- Vómitos por varias veces. Para asegurarse que éste no es un problema, intente que el niño beba pequeñas cantidades de líquidos como Sprite o

gingerel y paletas de hielo.

- Sangrado. Puede ser normal que el niño escupa pequeñas cantidades de sangre. Sin embargo si hay más de una cucharada o dura más de 1 día, avísele a su doctor.
- Fiebre persistente.
- Dolor de garganta. Le puede doler la garganta por un día o dos después de la prueba. Si es realmente fuerte o no desaparece, comuníquese con su doctor.

Para más información o para localizar a un gastroenterólogo pediátrico en su área por favor visite nuestro sitio web: www.naspgghan.org

RECORDATORIO IMPORTANTE: Esta información es proporcionada por la Asociación Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas (NASPGHAN), como información general y no como base definitiva para diagnóstico o tratamiento en ningún caso en particular. Es sumamente importante que consulte a su médico sobre su condición específica.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:



NASPGHAN • PO Box 6 • Flourtown, PA 19031
215-233-0808 • Fax: 215-233-3918