


Endoscopia Alta Para Niños



¿Qué es una endoscopia alta?

Tu doctor ha recomendado una endoscopia alta (también llamada esófago-gastroduodenoscopia o EGD). Esta es una prueba especial que le permite a tu doctor mirar directamente dentro del tubo por donde tragamos, el estómago y la parte alta del intestino delgado,

para ayudarlo a averiguar por qué los niños tienen dolor de barriga, diarrea, vómito o problemas para crecer.

Después de que el doctor te dé medicinas que te ayudan a dormir, usar un tubo delgado y flexible con una cámara y una luz para mirar dentro del tubo por donde tragas, el estómago y la parte alta del intestino delgado. El doctor puede tomar muestras muy pequeñas de tejido, del tamaño de una cabeza de alfiler. Esto puede ayudar a tu doctor a explicar por qué podrías tener dolor de barriga (estómago), excremento acuoso (diarrea), vómito o problemas para crecer.

Razones por las que los niños pueden necesitar una endoscopia alta

Hay muchas razones por las que los niños pueden necesitar una endoscopia alta incluyendo:

- Vómito
- Problemas para tragar
- Problemas para crecer
- Diarrea
- Dolor de la barriga
- Sacar alimentos, monedas y otras cosas que se quedan atoradas

¿Qué pasa antes y después de la prueba?

Antes de la prueba, en la mañana de la prueba, no se supone que comas o bebas nada, puesto que esto puede causar problemas con las medicinas que te ayudan a dormir durante la prueba.

Después de la prueba, su doctor puede tener fotos para mostrarte a ti y a tu familia. Al mismo tiempo, puede decirle a tu familia si hay alguna medicina para ti. Una vez que puedas beber líquidos sin problemas, puedes empezar a comer de nuevo e ir a casa. Algunos niños se sienten mal después de la prueba y pueden ser controlados un poco más.

Después de la prueba, has que tus padres llamen a tu doctor si tienes...

- Dolor de barriga por más de una hora. La mayoría de los niños se siente bien después de la prueba.
- Vómitos por varias veces. Para asegurarse que éste no es un problema, intenta beber cantidades pequeñas de bebidas como Sprite, o come un poco de una paleta de hielo.
- Sangrado. Puede ser normal que escupas pequeñas cantidades de sangre. Sin embargo, si escupes más de una cucharada o dura más de 1 día, avísales a tus padres y a tu doctor.
- Fiebre. Si hay fiebre persistente, avísale a tu doctor.
- Dolor de garganta. Te puede doler la garganta por un día o dos después de la prueba. Si es realmente fuerte o no desaparece, avísales a tus padres y a tu doctor.

Para más información o para localizar a un gastroenterólogo pediátrico en su área por favor visite nuestro sitio web: www.naspghan.org

RECORDATORIO IMPORTANTE: Esta información es proporcionada por la Asociación Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas (NASPGHAN), como información general y no como base definitiva para diagnóstico o tratamiento en ningún caso en particular. Es sumamente importante que consulte a su médico sobre su condición

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:



NASPGHAN • PO Box 6 • Flourtown, PA 19031
215-233-0808 • Fax: 215-233-3918